



Impfkalender 2022 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Januar 2022

 **Säuglinge und Kleinkinder**
(2 – 23 Monate)

 **Kinder und Jugendliche**
(2 – 17 Jahre)

 **Erwachsene**
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)										Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)						Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60	
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)															
Tetanus		G1 ^b 6-fach-Impfung	N	G2 6-fach-Impfung	N	G3 ^c 6-fach-Impfung	N				A1	N	A2	N			A alle 10 Jahre		
Diphtherie	N											A1	N	A2	N		A alle 10 Jahre		
Keuchhusten (Pertussis)	N											A1	N	A2	N		A3 ^e	N	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)	N																		
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	N																	A	N
Hepatitis B							N												
Pneumokokken		G1 ^b	N	G2	N	G3 ^c	N										S ^g		
Meningokokken C							G1	N											
Masern							G1 3-fach-Impfung MMR	N										S ^f	
Mumps									N										
Röteln									N										
Windpocken (Varizellen)							G1	N											
									N										
HPV (Humane Papillomviren)														G1 ^d +G2 ^d	N				
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 ^h +G2 ^h	
Grippe (Influenza)							Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere										S jährlich		

- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)
- S** Standardimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
- b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung: 6 Monate
- d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich
- e** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

- f** einmalige Impfung für alle nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
 - g** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff
 - h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.



Aktuelle Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auf unserer Seite [infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)